



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

Информационно-библиографический отдел

Международный День рассеянного склероза

27 мая



Отмечается “Международный День рассеянного склероза” ежегодно 27 мая.

Международный День рассеянного склероза был установлен Международной федерацией обществ рассеянного склероза с целью информирования о проблеме рассеянного склероза и глобальном движении организаций РС, а также расширение глобального движения организаций РС и объединение национальных и региональных организаций, поиска источников финансирования глобального движения по проблемам рассеянного склероза.

Рассеянный склероз - это заболевание, поражающее головной мозг, зрительные нервы, спинной мозг, что приводит к нарушению соответствующих функций организма. Она характеризуется образованием хаотически рассеянных очагов демиелинизации - потери миелина, белой жировой вещества, покрывающего аксоны - нервного волокна.

О заболевании ничего не было известно до 1835 года, когда французский врач Же. Крювелье описал первый случай. Два года назад в Великобритании сообщил о болезни Г. Карсвелл. До середины 19 в. уже были сведения о значительное число случаев, и в 1868 французский невролог Же. Шарко суммировал патоморфологические признаки рассеянного склероза и разработал его диагностические критерии.

Рассеянный склероз обычно начинается в молодости, но может проявиться в любой период от 15 до 60 лет. Женщины более подвержены заболеванию, чем мужчины. Самая высокая заболеваемость среди лиц белой расы, живущих в умеренном климате. Болезнь не передается по наследству. В списке причин полной инвалидности в продуктивном периоде жизни рассеянный склероз занимает третье место - после травм и ревматологических заболеваний.